LE PETIT JOURNAL CANIN

Du Club Éducation & Sport Canin St Brissonnais

Rue des Martins – 45500 St Brisson sur Loire
Tél : 02 38 36 73 64
Site : http://www.escsaintbrissonnais.fr/
Courriel : escsaintbrissonnais@orange.fr

N°119 – AVRIL 2021

ATTENTION, LES TIQUES SONT DE RETOUR

PIROPLASMOSE (BABÉSIOSE) CHEZ LE CHIEN

POINTS IMPORTANTS
La piroplasmose (ou babésiose) est une grave maladie parasitaire transmise par certaines tiques
La piroplasmose est très fréquente en France.
Fièvre, abattement, urines marron foncé sont des signes évocateurs mais des analyses sanguines sont nécessaires pour établir le diagnostic
Les formes atypiques de la maladie ne sont pas exceptionnelles
Le traitement donne de bons résultats mais doit être entrepris le plus rapidement possible. De graves complications hépatiques et rénales sont toujours possibles.
La prévention contre les tiques est un moyen de lutte essentiel
La piroplasmose (babésiose) chez le chien encore appelée babésiose, est une maladie due à un parasite sanguin. Le parasite est transmis au chien par certaines tiques (en particulier Dermacentor reticulatus et Rhipicephalus sanguineus), à l'occasion d'une «morsure» au cours de laquelle la tique en prenant un repas de sang contamine le chien par le biais de sa salive infectée. La maladie est plus fréquente au printemps et à l'automne, période d'activité accrue des tiques.

La piroplasmose est présente sur pratiquement tout le territoire français mais avec parfois des foyers très localisés. Le Sud-Ouest et la périphérie du Massif Central sont les régions les plus touchées. Les foyers peuvent se déplacer d'une année à l'autre.

Le parasite le plus fréquent chez le chien est Babesia canis, mais il en existe plusieurs espèces (et sous-espèces) telles que Babesia gibsoni ouTheileria annae et toutes n'ont pas la même virulence.

La période d'incubation de la piroplasmose varie entre 7 et 21 jours selon l'espèce parasitaire en cause.

Une fois inoculé, le parasite rentre dans les globules rouges où il se multiplie et les fait littéralement exploser. Il s'ensuit une anémie, une chute des plaquettes sanguines et, à cause de la libération de l'hémoglobine, de graves complications rénales et hépatiques, …

Quels sont les symptômes de la piroplasmose (babésiose) chez le chien

L'évolution la plus classique est aiguë, voire suraiguë. Assez brutalement, le chien présente un abattement prononcé, ne mange plus, est très fatigué et présente une forte fièvre. Très vite, une grave anémie s'installe. Les urines peuvent devenir marron foncé (couleur thé ou café) dans environ 50 % des cas.
Il existe aussi des formes très atypiques de piroplasmose dans lesquelles les symptômes peuvent être respiratoires, cardiaques, digestifs, neurologiques, musculaires, cutanés, hémorragiques, …

Comment faire le diagnostic de la piroplasmose (babésiose) chez le chien ?
Les symptômes, s'ils sont évocateurs, ne sont pas spécifiques et il ne faut pas confondre cette maladie parasitaire avec diverses formes d'anémies hémolytiques, une envenimation ophidienne, d'autres maladies transmises par les tiques (Ehrlichiose) ou d'autres maladies parasitaires (Leishmaniose).
Il est donc nécessaire de faire des analyses sanguines et urinaires. La mise en évidence au microscope du parasite à l'intérieur de certains globules rouges permet un diagnostic de certitude. Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourir à des examens plus compliqués (immunologiques, PCR).

Quel est le pronostic de la piroplasmose (babésiose) chez le chien ?
C'est toujours une maladie grave qui peut entraîner la mort ou laisser de graves séquelles rénales ou hépatiques. Le délai de mise en place du traitement est un facteur pronostic important.

Traitement de la piroplasmose (babésiose) chez le chien
Il existe des traitements qui permettent d'éliminer le parasite. Ils donnent en général de très bons résultats et doivent être mise en œuvre le plus rapidement possible. Si des complications hépatiques ou rénales apparaissent, l'hospitalisation est de rigueur pour placer l'animal en soins intensifs, perfusions (voire transfusion sanguine), …
Après traitement, des rechutes sont possibles à partir de parasites persistants mais elles restent rares. Elles peuvent survenir une dizaine de jours après le premier épisode.

Comment prévenir la piroplasmose (babésiose) chez le chien, y a-t-il des races prédisposées ?
Il n'y a pas de race prédisposée mais des chiens qui, par leur mode de vie, sont plus exposés que d'autres comme les chiens de chasse ou les chiens de garde vivant à l'extérieur. Le nettoyage attentif et régulier des chenils est également important.

Il est important d'éviter que le chien attrape des tiques en utilisant des antiparasitaires actifs contre ces acariens. Mais attention, en fonction de l'âge et de la race de votre chien, certains antiparasitaires externes peuvent être contre-indiqués. Il faut demander conseil au vétérinaire pour adapter le traitement préventif. Après la promenade, inspecter attentivement l'animal et retirer toutes les tiques éventuellement présentes (utiliser de préférence un petit crochet spécial, disponible chez votre vétérinaire).



Crochet à tique : permet de retirer facilement toutes les tiques, sans laisser le rostre

Attention, un chien qui a fait une piroplasmose n’est pas protégé. Il peut donc se ré-infester ultérieurement.
Une chimioprévention par injection est possible mais les résultats sont divergents. La méthode est supposée assurer une protection de 4 à 6 semaines contre le parasite.
Il existe depuis un certain nombre d’années un vaccin contre la piroplasmose mais tous les animaux vaccinés ne sont pas complètement protégés. Il n’est pas efficace contre toutes les souches du parasite. Le vaccin permet de limiter la gravité des signes cliniques. La primo-vaccination se fait (à partir de l’âge de 5 mois) par 2 injections à 3-4 semaines d’intervalle. La protection s’installe environ 3 semaines après la première injection et dure environ 6 mois. Selon les risques auxquels le chien est exposé, un rappel 1 à 2 fois par an est nécessaire. Il est préférable de vacciner les chiens en dehors des périodes à risque. Le faire de préférence de décembre à mars.
Après une piroplasmose, il faut attendre 8 semaines avant de vacciner le chien.

Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis



Humour

INFO CLUB :

Les horaires du couvre-feu ayant changé, passage de 18H00 à 19H00, nous reprenons nos horaires d'avant.
Les cours d'éducation du Samedi commencent à 15H00, venez vers 14H30 pour détendre vos chiens, prendre le café …

Nous organisons le DIMANCHE 11 AVRIL à partir de 09H00, une formation « Attestation d'Aptitude pour les Maîtres de Chien Catégorisé ».
Inscriptions avant le 03 AVRIL 2021 auprès de Guy PERRICHON.

PRENEZ SOIN DE VOUS !!!

- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et **http://www.doglle.com/** et **https://www.sccexpo.fr/fr-FR**
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU, Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'**Année** puis **Recherche par discipline et par date**
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre **Activité** puis **Concours**

Directeur de publication : Frédéric AUBRY
Rédacteur en Chef : Guy PERRICHON
Comité de rédaction : G. PERRICHON - L. MARGER-LEONARD – D. ALLAIN – V. DELION – H. ALLAIN
Source des documents : Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis
Contact pour le "Petit Journal Canin" : Guy Perrichon - Courriel : perrichon.guy@orange.fr